

Abalos JW, Wygodginsky P. Las Triatominae Argentinas (Reduviidae, Hemiptera). Publ Inst Med Reg. Universidad Nacional; 1951;601: 1–179.

Aguirre PE. Presencia de *Trypanosoma cruzi* en mamíferos y triatomideos de Nuevo Leon, Monterrey, Mexico. Rev Kuba Med Trop Parasitol. 1947;3: 120–121.

Alayo P. Catálogo de la Fauna Cubana. XVI. Los hemípteros de Cuba. III. Familia Reduviidae. Museo Felipe Poey Academia de Ciencias de Cuba, Trabajos de Divulgación. Museo Felipe Poey Academia de Ciencias de Cuba; 1967;41: 1–48.

Aldana E, Viera D, Lizano E. Morfología de huevos y ninfas de *Psammolestes salazari* (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Caribbean J Sci. 1997;33: 70–74.

Almeida CE, Faucher L, Lavina M, Costa J, Harry M. Molecular individual-based approach on *Triatoma brasiliensis*: Inferences on triatomine foci, *Trypanosoma cruzi* natural infection prevalence, parasite diversity and feeding sources. PLoS Negl Trop Dis. 2016;10: e0004447.

Alvarado-Otegui JA, Ceballos LA, Orozco MM, Enriquez GF, Cardinal MV, Cura C, et al. The sylvatic transmission cycle of *Trypanosoma cruzi* in a rural area in the humid Chaco of Argentina. Acta Trop. 2012;124: 79–86.

Angulo-Silva VM, Castellanos-Domínguez YZ, Flórez-Martínez M, Esteban-Adarme L, Pérez-Mancipe W, Farfán-García AE, et al. Human trypanosomiasis in the Eastern Plains of Colombia: New transmission scenario. Am J Trop Med Hyg. 2016;94: 348–351.

Aramburú RM, Berkunsky I, Formoso AE, Cicchino A. Ectoparasitic load of Blue-crowned Parakeet (*Aratinga a. acuticaudata*, Psittacidae) nestlings. Ornitología Neotropical. 2013;24: 257–265.

Arzube-Rodriguez M. Investigación de la fuente alimenticia del *T. dimidiata*, Latr. 1811 (Hemiptera: Reduviidae), mediante la reacción de precipitina. Rev Ecuat Hig Med Trop. 1966;23: 137–152.

Bar ME, Wisnivesky-Colli C. *Triatoma sordida* Stål 1859 (Hemiptera, Reduviidae: Triatominae) in palms of northeastern Argentina. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2001;96: 895–899.

Bosseno M-F, Barnabé C, Sierra MJR, Kengne P, Guerrero S, Lozano F, et al. Wild ecotopes and food habits of *Triatoma longipennis* infected by *Trypanosoma cruzi* lineages I and II in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2009;80: 988–991.

Cantillo-Barraza O, Garcés E, Gómez-Palacio A, Cortés LA, Pereira A, Marcket PL, et al. Eco-epidemiological study of an endemic Chagas disease region in northern Colombia reveals the importance of *Triatoma maculata* (Hemiptera: Reduviidae), dogs and *Didelphis marsupialis* in *Trypanosoma cruzi* maintenance. Parasit Vectors. 2015;8: 482.

Barreto MP, Carvalheiro J. Estudos sobre reservatórios e vectores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XII. Inquérito preliminar sobre triatomíneos silvestres no Município de Uberaba, Minas Gerais. Rev Bras Biol. 1966;26: 5–14.

Barreto MP, Carvalheiro JR. Estudos sôbre reservatórios e vectores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XVIII. Observações sobre a ecologia do *Psammolestes tertius* Lent & Jurberg, 1965 (Hemiptera, Reduviidae). Rev Bras Biol. 1967;27: 13–25.

Barreto MP, Carvalheiro JR. Estudos sobre reservatórios e vetores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XXVIII: sobre o encontro de *Triatoma sordida* Stal, 1859 e de *Rhodnius neglectus* Lent, 1954 em ninhos de pássaros da família Furnariidae (Hemiptera, Reduviidae). Rev Bras Biol. 1968;28: 289–293.

Barreto MP. Estudos sôbre reservatórios e vectores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XVII. Contribuição para o estudo dos focos naturais da tripanossomose americana, com especial referência à região nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. 1967;1: 23–35.

Barreto MP. Estudos sôbre reservatórios e vectores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XXXI. Observações sobre a associação entre reservatórios e vectores, com especial referência à região nordeste do estado de São Paulo. Rev Bras Biol. 1968;28: 481–494.

Barreto MP. Estudos sôbre reservatórios e vectores silvestres do *Trypanosoma cruzi*. XLV. Inquérito preliminar sobre triatomíneos silvestres no sul do Estado de Mato Grosso, Brasil (Hemiptera, Reduviidae). Rev Bras Biol. agris.fao.org; 1971;31: 225–233.

Barros GC, Mayrink W, Salgado AA, Barros R, Sessa PA. Contribuição para o conhecimento da doença de Chagas autóctone no estado do Espírito Santo. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1975;17: 319–329.

Bento DN da C, Branco AZCL, Freitas MR, Pinto A da S. Epidemiologic studies of Chagas disease in the urban zone of Teresina. State of Piauí, northeastern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. SBMT; 1984;17: 199–203.

Bezerra CM, Cavalcanti LP de G, Souza R de CM de, Barbosa SE, Xavier SC das C, Jansen AM, et al. Domestic, peridomestic and wild hosts in the transmission of *Trypanosoma cruzi* in the Caatinga area colonised by *Triatoma brasiliensis*. Mem Inst Oswaldo Cruz. SciELO Brasil; 2014;109: 887–898.

Biagi F, Tay J, Guzman-Garcia C, Fong P. Tetitlan, foco endémico de enfermedad de Chagas en Mexico. Rev Fac Med Univ Nac Auton Mex. 1964;6: 625–631.

Botto-Mahan C, Sepúlveda M, Vidal M, Acuña-Retamar M, Ortiz S, Solari A. *Trypanosoma cruzi* infection in the sylvatic kissing bug *Mepraiasajardoi* from the Chilean Southern Pacific Ocean coast. Acta Trop. 2008;105: 166–169.

Brenière SF, Pietrokovsky S, Gastélum EM, Bosseno M-F, Soto MM, Ouassi A, et al. Feeding patterns of *Triatoma longipennis* Usinger (Hemiptera, Reduviidae) in peridomestic habitats of a rural community in Jalisco State, Mexico. J Med Entomol. 2004;41: 1015–1020.

Brewer M, Garay M, Gorla D, Murua F, Favot R. Caracterización de los estadíos ninfales del género *Triatoma* (Laporte, 1833). I. *Triatoma infestans* Klug, 1834 (Hemiptera: Reduviidae). Rev Soc Entomol Argent. 1981;40: 91–102.

Brumpt E, Mazzoti L, Brumpt LC. Enquetes epidemiologiques sur la maladie de C. Chagas au Mexique. Reduvides vecteurs, animaux reservoirs de virus, cas humains. Ann Parasitol. 1939;17: 299–312.

Bruner SC. Synopsis of Cuban Reduviidae. Mem Soc Cubana Hist Nat “Felipe Poey.” 1926;7: 65–82.

Buitrago R, Bosseno M-F, Depickère S, Waleckx E, Salas R, Aliaga C, et al. Blood meal sources of wild and domestic *Triatoma infestans* (Hemiptera: Reduviidae) in Bolivia: connectivity between cycles of transmission of *Trypanosoma cruzi*. Parasit Vectors. 2016;9: 214.

Canals M, Cruzat L, Molina MC, Ferreira A, Cattan PE. Blood host sources of *Mepraia spinolai* (Heteroptera: Reduviidae), wild vector of chagas disease in Chile. J Med Entomol. 2001;38: 303–307.

Caranha L, Lorosa ES, Rocha D da S, Jurberg J, Galvão C. Feeding sources evaluation of *Panstrongylus lutzi* (Neiva & Pinto, 1923) (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) in the State of Ceará. Rev Soc Bras Med Trop. SBMT; 2006;39: 347–351.

Carcavallo RU, Martínez A. Biología, ecología y distribución geográfica de los triatominos americanos. In: Carcavallo RU, Rabinovich JE, Tonn RJ, editors. Factores biológicos y ecológicos en la enfermedad de Chagas, Vol I. Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina, Buenos Aires.; 1985. pp. 149–208.

Carcavallo RU. The subfamily Triatominae (Hemiptera, Reduviidae): systematics and some ecological factors. In: Brenner RR, de la Merced Stoka A, editors. Chagas' disease vectors Volume 1 Taxonomic, ecological and epidemiological aspects. 1987. pp. 1–20.

Carcavallo R, Otero MA, Tonn RJ, Ortega R. Notas sobre la biología, ecología y distribución geográfica del *Psammolestes arthuri* (Pinto), 1926 (Hemiptera, Reduviidae). Descripción de los estadios imaginariales. Boletín Informativo de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. 1975;15: 231–239.

Carcavallo RU, Barreto P, Martinez A, Tonn R. El genero microtriatoma Prosen y Martinez, 1952 (Hemiptera, Reduviidae). Bol Dir Malariol Saneam. agris.fao.org; 1976;16: 231–240.

Carcavallo RU, Barata JMS, Costa AIP da, Serra OP. *Alberprosenia malheiroi* Serra, Atzingen & Serra, 1987 (Hemiptera, Reduviidae): redescription and bionomics. Rev Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 1995;29: 488–495.

Carcavallo RU, da Silva Rocha D, Galindez Giron I. Feeding sources and patterns. In: Carcavallo RU, Galindez Giron I, Jurberg J, editors. Atlas of Chagas' disease vectors in the Americas Vol 2. 1998. pp. 537–560.

Carcavallo RU, Tonn R. Capítulo XV. *Rhodnius prolixus*. In: Carcavallo RU, Rabinovich JE, Tonn RJ, editors. Factores biológicos y ecológicos en la enfermedad de Chagas. 1985. pp. 209–217.

Carrasco HJ, Torrellas A, García C, Segovia M, Feliciangeli MD. Risk of *Trypanosoma cruzi* I (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) transmission by *Panstrongylus geniculatus*

(Hemiptera: Reduviidae) in Caracas (Metropolitan District) and neighboring States, Venezuela. Int J Parasitol. 2005;35: 1379–1384.

Ceballos LA, Piccinelli RV, Berkunsky I, Kitron U, Görtler RE. First finding of melanic sylvatic *Triatoma infestans* (Hemiptera: Reduviidae) colonies in the Argentine Chaco. J Med Entomol. 2009;46: 1195–1202.

Cecere MC, Loporace M, Fernández MP, Zárate JE, Moreno C, Görtler RE, et al. Host-Feeding Sources and Infection With *Trypanosoma cruzi* of *Triatoma infestans* and *Triatoma eratyrusiformis* (Hemiptera: Reduviidae) From the Calchaqui Valleys in Northwestern Argentina. J Med Entomol. 2016; doi:10.1093/jme/tjw002

Christensen HA, de Vasquez AM. Host feeding profiles of *Rhodnius pallescens* (Hemiptera: Reduviidae) in rural villages of Central Panama. Am J Trop Med Hyg. 1981;30: 278–283.

Christensen HA, Sousa OE, de Vasquez AM. Host feeding profiles of *Triatoma dimidiata* in peridomestic habitats of western Panama. Am J Trop Med Hyg. cat.inist.fr; 1988;38: 477–479.

Christensen HA, Whitlaw JT, Chaniotis BN, De VASquez AM. Sylvatic hosts of *Rhodnius pallescens* (Hemiptera: Reduviidae) nymphs in the Panama canal zone. J Med Entomol. The Oxford University Press; 1980;17: 182–182.

Cichero JA, Carcavallo RU. Notas sobre la bioecología del *Triatoma breyeri* Del Ponte, 1929. Neotropica. 1967;13: 52–53.

Costa J, de Almeida JR, Britto C, Duarte R, Marchon-Silva V, Pacheco R da S. Ecotopes, natural infection and trophic resources of *Triatoma brasiliensis* (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae). Mem Inst Oswaldo Cruz. 1998;93: 7–13.

D'Alessandro A, Barreto P, Duarte CA. Distribution of triatomine-transmitted trypanosomiasis in Colombia and new records of the bugs and infections. J Med Entomol. 1971;8: 159–172.

D'Alessandro A, Barreto P, Thomas M. Nuevos registros de triatominos domiciliarios y extradomiciliarios en Colombia. Colomb Méd. 1981;12: 75–85.

de Andrade-Neto OA, de Arruda MCC, Kerkhoff J, Lunardi RR, Arrais-Silva WW. Risk of domiciliation of *Triatoma williami* Galvão, Souza e Lima, 1965 in a municipality of Brazilian Legal Amazon region. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2012;2: S265–S267.

De la Riva J, Matias A, Torrez M, Martínez E, Dujardin JP. Adult and nymphs of *Microtriatoma trinidadensis* (Lent, 1951) (Hemiptera: Reduviidae) caught from peridomestic environment in Bolivia. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2001;96: 889–894.

de Lima JS, Rocha FL, Alves FM, Lorosa ES, Jansen AM, de Miranda Mourão G. Infestation of arboreal nests of coatis by triatomine species, vectors of *Trypanosoma cruzi*, in a large Neotropical wetland. J Vector Ecol. 2015;40: 379–385.

Dias FBS, Quartier M, Romaña CA, Diotaiuti L, Harry M. *Tamandua tetradactyla* Linnaeus, 1758 (Myrmecophagidae) and *Rhodnius robustus* Larrousse, 1927 (Triatominae)

infection focus by *Trypanosoma rangeli* Tejera, 1920 (Trypanosomatidae) in *Attalea phalerata* Mart. ex Spreng (Arecaceae) palm tree in the Brazilian Amazon. Infect Genet Evol. 2010;10: 1278–1281.

Dias E, Mello GB, Costa D, Damasceno R, Azevedo M. Investigações sobre esquisotripanose de morcegos no Estado do Pará. Encontro do barbeiro *Cavernicola pilosa* como transmissor. Revista Brasileira de Biologia. 1942; 2: 103–110.

Dias FBS, Bezerra CM, Machado EM de M, Casanova C, Diotaiuti L. Ecological aspects of *Rhodnius nasutus* Stål, 1859 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) in palms of the Chapada do Araripe in Ceará, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2008;103: 824–830.

Dias-Lima AG, Menezes D, Sherlock I, Noireau F. Wild habitat and related fauna of *Panstrongylus lutzi* (Reduviidae, Triatominae). J Med Entomol. 2003;40: 989–990.

Diotaiuti L, Loiola CF, Falcão PL, Dias JCP. The ecology of *Triatoma sordida* in natural environments in two different regions of the state of Minas Gerais, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; 1993;35: 237–245.

Elkins JC. The Reduviidae of Texas. Tex J Sci. 1951;4: 307–312.

Fairchild GB. An annotated list of the bloodsucking insects, ticks, and mites known from Panama. The American Journal of Tropical Medicine. 1943;23: 569–591.

Cardoso SFM. Avaliação de vetores da Doença de Chagas na área de influência direta da usina hidrelétrica Corumbá IV, Goiás. Dissertação de Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde Pró-Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa da Universidade Católica de Goiás Goiânia, Goiás. 2006; 68.

Forattini OP, Rocha e Silva EO da, Ferreira OA, Rabello EX, Pattoli DGB. Ecological aspects of South American trypanosomiasis: III - local dispersion of triatomids, with special reference to *Triatoma sordida*. Rev Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 1971;5: 193–205.

Freitas J, Siqueira AF, Ferreira OA. Investigações epidemiológicas sobre triatomíneos de hábitos domésticos e silvestres com auxílio da reação de precipitina. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1960;2: 90–99.

Freitas SPC, Lorosa ES, Rodrigues DCS, Freitas ALC, Gonçalves TCM. Feeding patterns of *Triatoma pseudomaculata* in the state of Ceará, Brazil. Rev Saúde Pública. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2005;39: 27–32.

Galindo P, Fairchild GB. Notes on habits of two bloodsucking bugs, *Triatoma dispar* Lent, 1950, and *Eratyrus cuspidatus* Stal, 1859 (Hemiptera: Reduviidae). Proc Entomol Soc Wash. 1962;64: 229–230.

Gamboa CI. Comprobacion de *Rhodnius prolixus* extradoméstico em Venezuela. Arch Venez Med Trop Parasitol Med. 1965;5: 283–298.

Gamboa CJ. La población silvestre de *Rhodnius prolixus* en Venezuela. Boletín Informativo de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. 1970;10: 186–207.

Gaunt M, Miles M. The ecotopes and evolution of triatomine bugs (Triatominae) and their associated trypanosomes. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2000;95: 557–565.

Gilbert C, Schaack S, Pace JK 2nd, Brindley PJ, Feschotte C. A role for host-parasite interactions in the horizontal transfer of transposons across phyla. Nature. 2010;464: 1347–1350.

Gonçalves TC, Rocha DS, Cunha RA. Feeding patterns of *Triatoma vitticeps* in the State of Rio de Janeiro, Brazil. Rev Saude Publica. 2000;34: 348–352.

González-Britez N, Vega C, Rolón M, Rojas de Arias A. Triatomines and other arthropods in bird nests in native and Mennonite communities of the paraguayan Chaco. Abstracts of XVTH International Congress for Tropical Medicine and Malaria, Cartagena – Colombia. 2000;2: 89.

Gonzalez-Angulo W, Ryckman RE. Epizootiology of *Trypanosoma cruzi* in southwestern North America. IX. An investigation to determine the incidence of *Trypanosoma cruzi* infections in Triatominae and man on the Yucatan Peninsula of Mexico. J Med Entomol. 1967;4: 44–47.

Gorchakov R, Trosclair LP, Wozniak EJ, Feria PT, Garcia MN, Gunter SM, et al. *Trypanosoma cruzi* infection prevalence and bloodmeal analysis in triatomine vectors of Chagas disease from rural peridomestic locations in Texas, 2013–2014. J Med Entomol. The Oxford University Press; 2016;53: 911–918.

Gottdenker NL, Chaves LF, Calzada JE, Saldaña A, Carroll CR. Host life history strategy, species diversity, and habitat influence *Trypanosoma cruzi* vector infection in Changing landscapes. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6: e1884.

Grijalva MJ, Villacis AG. Presence of *Rhodnius ecuadoriensis* in sylvatic habitats in the southern highlands (Loja Province) of Ecuador. J Med Entomol. 2009;46: 708–711.

Grijalva MJ, Palomeque FS, Villacís AG, Black CL, Arcos-Terán L. Absence of domestic triatomine colonies in an area of the coastal region of Ecuador where Chagas disease is endemic. Mem Inst Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz; 2010;105: 677–681.

Grijalva MJ, Suarez-Davalos V, Villacis AG, Ocaña-Mayorga S, Dangles O. Ecological factors related to the widespread distribution of sylvatic *Rhodnius ecuadoriensis* populations in southern Ecuador. Parasit Vectors. 2012;5: 17.

Guarneri AA, Pereira MH, Diotaiuti L. Influence of the blood meal source on the development of *Triatoma infestans*, *Triatoma brasiliensis*, *Triatoma sordida*, and *Triatoma pseudomaculata* (Heteroptera, Reduviidae). J Med Entomol. 2000;37: 373–379.

Guerrero de Moyeja L, Scorza JV. Las fuentes alimenticias de algunos Triatominae silvestres en los llanos centro-occidentales de Venezuela. Boletín de la Dirección Malariología y Saneamiento Ambiental. 1981;21: 129–139.

Guerrero L, García MG, Quesada MD. Campaña contra la enfermedad de Chagas. Kasmera. 1965;2: 47–97.

Guevara Á, Moreira J, Criollo H, Vivero S, Racines M, Cevallos V, et al. First description of *Trypanosoma cruzi* human infection in Esmeraldas province, Ecuador. Parasit Vectors. 2014;7: 358.

Guimaraes FN, Jansen G. A new wild vector of *T. cruzi*. Mem Inst Oswaldo Cruz. 1943;38: 437–441 pp.

Gurgel-Gonçalves R, Cuba CAC. Population structure of *Rhodnius neglectus* Lent and *Psammolestes tertius* Lent & Jurberg (Hemiptera, Reduviidae) in bird nests (Furnariidae) on *Mauritia flexuosa* palm trees in Federal District of Brazil. Rev Bras Zool. 2007;24: 157–163.

Gurgel-Gonçalves R, Cuba CAC. Infestation of thornbird nests (Passeriformes: Furnariidae) by *Psammolestes tertius* (Hemiptera: Reduviidae) across Brazilian Cerrado and Caatinga ecoregions. Zoologia. 2011;28: 411–414.

Gurgel-Gonçalves R, Duarte MA, Ramalho ED, Palma ART, Romaña CA, Cuba-Cuba CA. Distribuição espacial de populações de triatomíneos (Hemiptera: Reduviidae) em palmeiras da espécie *Mauritia flexuosa* no Distrito Federal, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. 2004;37: 241–247.

Herrer A, Lent H, Wygodzinsky P. Contribución al conocimiento del género *Belminus* Stal, 1859 (Triatominae, Reduviidae, Hemiptera). An Inst Med Reg Univ Tucuman. 1954; 85–106.

Herrer A. Geographical distribution of Chagas' disease and of its vectors in Peru. Bol Oficina Sanit Panam. 1960;49: 572–581.

Hicks EA. Check-list and bibliography on the occurrence of insects in birds' nest. Supplement I. Iowa City: The Iowa State University Press; 1962. pp. 233–348.

Johnson CM, Rivas CT. La enfermedad de Chagas en Panamá. IX Reunión Soc Argent Pat Reg. 1936;1: 245.

Kjos SA, Marcket PL, Yabsley MJ, Kitron U, Snowden KF, Logan KS, et al. Identification of bloodmeal sources and *Trypanosoma cruzi* infection in triatomine bugs (Hemiptera: Reduviidae) from residential settings in Texas, the United States. J Med Entomol. 2013;50: 1126–1139.

Klotz SA, Dorn PL, Mosbacher M, Schmidt JO. Kissing bugs in the United States: risk for vector-borne disease in humans. Environ Health Insights. 2014;8: 49–59.

Lent H, Wygodzinsky P. Revision of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), and their significance as vectors of Chagas' disease. Bull Am Mus Nat Hist. 1979;163: 123–520.

Lent H. On the biology, classification and geographical distribution of *Psammolestes coreodes* Bergroth, 1911, found in birds' nests in Brazil (Hem. Triatomidae). Revista de Entomologia. 1935;5: 381–396.

Lent H. *Triatoma* and Chagas' disease. Proceedings 4th Intern Congr Trop Med Malaria Washington 1948. 1948;2: 1690–1701.

Lorosa ES, Andrade RE de, Santos SM dos, Pereira CA, Vinhaes M da C, Jurberg J. Estudo da infecção natural e fontes alimentares de *Triatoma costalimai* Verano & Galvao,

1959, *Rhodnius neglectus* Lent, 1954 e *Psammoletes tertius* Lent & Jurberg, 1965 do estado de Goias, Brasil, através da técnica de precipitina. Entomol Vectores. 1999;6: 405–414.

Lorosa ES, Jurberg J, Almeida Souza AL, Vinhaes MC, Nunes IM. Hemolinfa de Dictyoptera na manutenção do ciclo biológico silvestre de *Triatoma rubrovaria* (Blanchard 1843) e *Triatoma circummaculata* (Stål, 1859) (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae). Entomol Vectores. Jul-Ago-Set 2000;7: 287–296.

Lorosa ES, de Andrade RE, Pujol-Luz JR, Jurberg J, Carcavallo RU. Determinação das fontes alimentares e da infecção natural do *Triatoma jurbergi* (Carcavallo, Galvão & Lent, 1998) *Triatoma vandae* Carcavallo, Jurberg, Rocha, Galvão, Noireau & Lent, 2001 capturados no estado do Mato Grosso, Brasil. Zoociências. 2003;5: 243–252.

Lucena DT. Estudos sobre a doença de Chagas no nordeste do Brasil. Rev Bras Malariol Doencas Trop. 1970;22: 3–173.

Lucero DE, Ribera W, Pizarro JC, Plaza C, Gordon LW, Peña R Jr, et al. Sources of blood meals of sylvatic *Triatoma guasayana* near Zurima, Bolivia, assayed with qPCR and 12S cloning. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8: e3365.

Luz E, Borba AM. Triatomíneos encontrados no Paraná. Aspectos biológicos. Na Fac Med Univ Fed Paraná. 1966;

Maes JM. Triatominae (Heteroptera Reduviidae) of Nicaragua. Bulletin SRBE. 2002;138: 90–94.

Marcondes CB, Dias JCP, Guedes LA, Ferraz Filho AN, Rodrigues VLCC, Mendonça DD. Estudo epidemiológico de fontes de alimentação sanguínea dos triatomíneos da fazenda aroeira (Catolé do Rocha, Paraíba) e circunvizinhanças. Rev Soc Bras Med Trop. SBMT; 1991;24: 137–140.

Marti GA, Echeverria MG, Waleckx E, Susevich ML, Balsalobre A, Gorla DE. Triatominae in furnariid nests of the Argentine Gran Chaco. J Vector Ecol. 2014;39: 66–71.

Martins LPA, Castanho REP, Casanova C, Caravelas DT, Frias GT, Ruas-Neto AL, et al. Rupestrian triatomines infected by Trypanosomatidae, collected in Quaraí, Rio Grande do Sul, 2003. Rev Soc Bras Med Trop. SBMT; 2006;39: 198–202.

Mazza S. Remarks on Chagas' disease in Bolivia. Prensa Med Argent. 1942;29: 1–15.

Mazzotti L. Triatomideos de México y su infección natural por *Trypanosoma cruzi*, Chagas. Medicina México. 1940;20.

Miles MA, de Souza AA, Póvoa M. Chagas' disease in the Amazon basin III. Ecotopes of ten triatomine bug species (Hemiptera: Reduviidae) from the vicinity of Belém, Pará State, Brazil. J Med Entomol. 1981;18: 266–278.

Miles MA, de Souza A, Povoa MM. The ecotope of *Panstrongylus megistus* (Hemiptera, Reduviidae) in the Horto Forest (Rio de Janeiro). Rev Bras Biol. 1982;42: 31–36.

Miles MA, Arias JR, Souza AA de. Chagas' disease in the Amazon Basin: V. Periurban palms as habitats of *Rhodnius robustus* and *Rhodnius pictipes* - Triatomine vectors of Chagas' disease. Mem Inst Oswaldo Cruz. 1983;78: 391–398.

Minter DM. Feeding patterns of some triatomine vector species. New Approaches in American Trypanosomiasis Research. Washington, D.C., Pan American Health Organization; 1976. pp. 33–47.

Monte GLS, Tadei WP, Farias TM. Ecoepidemiology and biology of *Eratyrus mucronatus* Stål, 1859 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae), a sylvatic vector of Chagas disease in the Brazilian Amazon. Rev Soc Bras Med Trop. 2014;47: 723–727.

Mota J, Chacon JC, Gutiérrez-Cabrera AE, Sánchez-Cordero V, Wirtz RA, Ordoñez R, et al. Identification of blood meal source and infection with *Trypanosoma cruzi* of Chagas disease vectors using a multiplex cytochrome b polymerase chain reaction assay. Vector Borne Zoonotic Dis. online.liebertpub.com; 2007;7: 617–627.

Neiva A. Revisao do genero *Triatoma* Lap. Ph. D Thesis, Rio de Janeiro, Brazil; 1914.

Neiva A, Pinto C. Estado actual dos conhecimentos sobre o gênero *Rhodnius* Stål, com a descrição de uma nova espécie. Brasil Méd. 1923;37: 20–24.

Neiva A, Pinto C, Lent H. Notas sobre triatomideos do Rio Grande do Sul e descrição de uma nova espécie. Mem Inst Oswaldo Cruz. 1939;34: 607–610.

Noireau F, Flores R, Gutierrez T, Abad-Franch F, Flores E, Vargas F. Natural ecotopes of *Triatoma infestans* dark morph and other sylvatic triatomines in the Bolivian Chaco. Trans R Soc Trop Med Hyg. trstmh.oxfordjournals.org; 2000;94: 23–27.

Oliveira MA, Ferreira RL, Carneiro MA, Diotaiuti L. Ecology of *Cavernicola pilosa* Barber, 1937 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) in the Boa Esperança Cave, Tocantins, Brazil. Ecotropica. 2008;14: 63–68.

Packchanian A. Natural Infection of *Triatoma gerstaeckeri* with *Trypanosoma cruzi* in Texas. Public Health Rep. Association of Schools of Public Health; 1939;54: 1547–1554.

Pellegrino J. Vectors of Chagas' disease in the state of Minas Gerais. Rev Assoc Med Minas Gerais. 1951;2: 43–66.

Peña VH, Fernández GJ, Gómez-Palacio AM, Mejía-Jaramillo AM, Cantillo O, Triana-Chávez O. High-resolution melting (HRM) of the cytochrome B gene: a powerful approach to identify blood-meal sources in Chagas disease Vectors. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6: e1530.

Pifano FC. La dinámica epidemiológica de la enfermedad de Chagas en el Valle de Los Naranjos, Estado Carabobo, Venezuela. I. Contribución al estudio de los focos naturales silvestres del *Schizotrypanum cruzi* Chagas 1909. Arch Venez Med Trop Parasitol Med. 1973;5: 1–29.

Pinto CM, Ocaña-Mayorga S, Tapia EE, Lobos SE, Zurita AP, Aguirre-Villacís F, et al. Bats, trypanosomes, and triatomines in Ecuador: New insights into the diversity,

transmission, and origins of *Trypanosoma cruzi* and Chagas disease. PLoS One. 2015;10: e0139999.

Pipkin AC. Reduviid bugs from central Panama and incidence of infection with hemoflagellates. J Parasitol. 1962;48: 103–111.

Ramsey JM, Gutiérrez-Cabrera AE, Salgado-Ramírez L, Peterson AT, Sánchez-Cordero V, Ibarra-Cerdeña CN. Ecological connectivity of *Trypanosoma cruzi* reservoirs and *Triatoma pallidipennis* hosts in an anthropogenic landscape with endemic Chagas disease. PLoS One. 2012;7: e46013.

Rebêlo JMM, Barros VLL de, Mendes WA. Triatominae species (Hemiptera: Reduviidae) in Maranhão State, Brazil. Cad Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz; 1998;14: 187–192.

Reyes-Lugo M, Reyes-Contreras M, Salvi I, Gelvés W, Avilán A, Llavaneras D, et al. The association of *Triatoma maculata* (Ericsson 1848) with the gecko *Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn 1782) (Reptilia: Squamata: Gekkonidae): a strategy of domiciliation of the Chagas disease peridomestic vector in Venezuela? Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1: 279–284.

Ribeiro G Jr, Gurgel-Gonçalves R, Reis RB, Santos CGSD, Amorim A, Andrade SG, et al. Frequent house invasion of *Trypanosoma cruzi*-infected triatomines in a suburban area of Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 2015;9: e0003678.

Ribeiro G Jr, Silva-Santos CG, Noireau F, Dias-Lima A. Potencial de dispersão de algumas espécies de Triatomíneos (Hemiptera: Reduviidae) por aves migratórias. Sitientibus Sér Ci Biol. 2006;6: 324–328.

Rocha e Silva EO, Souza JM, Andrade JC, Mello CS, Ferreira OA. Preferencia alimentar (entre sangue humano e ave) dos *Triatoma sordida* encontrados em casas habitadas da regiao norte do Estado de Sao Paulo, Brasil. Rev Saude Publica. 1977;11: 258–269.

Rodrigues B de A, Melo G de B. Contribuição ao estudo da Tripanosomiase Americana. Mem Inst Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz; 1942;37: 77–90.

Rodrigues VL, Ferraz Filho A do N, da Rocha e Silva EO, de Lima VL. The prevalence, infection indices and feeding habits of the Triatominae captured in an area of epidemiological surveillance. Rev Soc Bras Med Trop. 1992;25: 183–190.

Rossell O, Mogollón J, Pacheco J. Presencia de *Rhodnius robustus* Larrousse, 1927 (Hemiptera, Reduviidae) en el estado Trujillo, Venezuela (Comunicación preliminar). Malaria Saneam Amb. 1977;17: 230–233.

Ruas-Neto AL, Corseuil E, Cavalleri A. Development of rupestrian triatomines (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) following hemolymphagy on blaberids (Blattodea: Blaberidae) in Rio Grande do Sul State, Brazil. Entomol Vectores. 2001;8: 205–216.

Ruiz-Piña HA, Cruz-Reyes A. The opossum *Didelphis virginiana* as a synanthropic reservoir of *Trypanosoma cruzi* in Dzidzilché, Yucatán, México. Mem Inst Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz; 2002;97: 613–620.

Ryckman RE. Recent observations of cannibalism in *Triatoma* (Hemiptera: Reduviidae). J Parasitol. 1951;37: 433–434.

Ryckman RE. Biosystematics and hosts of the *Triatoma protracta* complex in North: (Hemiptera: Reduviidae; Rodentia: Cricetidae). University of California Press; 1962.

Ryckman RE. The genus *Paratriatoma* in western North America. J Med Entomol. 1971;8: 87–97.

Ryckman RE. The vertebrate hosts of the Triatominae of North and Central America and the West Indies (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Bulletin of the Society of Vector Ecologists. 1986;

Ryckman RE, Ryckman AE. Epizootiology Of *Trypanosoma cruzi* In Southwestern North America. X. The Biosystematics of *Dipetalogaster maximus* in Mexico (Hemiptera: Reduviidae)(Kinetoplastida: Trypanosomatidae). J Med Entomol. 1967;4: 180–188.

Ryckman RE, Ryckman JV. Epizootiology of *Trypanosoma cruzi* in Southwestern North America. XII. Does Gause's rule apply to ectoparasitic Triatominae? (Hemiptera: Reduviidae) (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) (Rodentia: Cricetidae). J Med Entomol. 1967;4: 379–386.

Salvatella R. Triatomíneos del Uruguay. Rev Méd Uruguay. 1986;2: 106–113.

Salvatella R. Aspectos do ciclo evolutivo de *Panstrongylus tупynambei* Lent, 1942 (Hemiptera Reduviidae) em laboratório. Rev Bras Malaria Doencas Trop. 1986;38: 7–10.

Salvatella AR, Rosa R, Basmadjian Y, Puime A, Guerrero J. *Triatoma rubrovaria* (Blanchard, 1843) (Hemiptera, Triatominae) y su alimentacion por “linfoclepsio” intraespecifico. Boletin de la Sociedad Zoologica del Uruguay Segunda Epoca. 1992;7: 21–22.

Salvatella R. Distribución de *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera-Triatominae) en Uruguay. Revista de la Sociedad Uruguaya de Parasitología. 1987;1: 51–56.

Sandoval CM, Duarte R, Gutierrez R, Rocha D da S, Angulo VM, Esteban L, et al. Feeding sources and natural infection of *Belminus herreri* (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) from dwellings in Cesar, Colombia. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2004;99: 137–140.

Santos CB dos, Ferreira AL, Leite GR, Ferreira GEM, Rodrigues AAF, Falqueto A. Peridomiciliary colonies of *Triatoma vitticeps* (Stal, 1859) (Hemiptera, Reduviidae, Triatominae) infected with *Trypanosoma cruzi* in rural areas of the state of Espírito Santo, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz; 2005;100: 471–473.

Sarquis O, Sposina R, de Oliveira TG, Mac Cord JR, Cabello PH, Borges-Pereira J, et al. Aspects of peridomiciliary ecotopes in rural areas of northeastern Brazil associated to triatomine (Hemiptera, Reduviidae) infestation, vectors of chagas disease. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2006;101: 143–147.

Sarquis O, Carvalho-Costa FA, Oliveira LS, Duarte R, D Andrea PS, de Oliveira TG, et al. Ecology of *Triatoma brasiliensis* in northeastern Brazil: seasonal distribution, feeding

resources, and *Trypanosoma cruzi* infection in a sylvatic population. J Vector Ecol. 2010;35: 385–394.

Sherlock IA, Serafim EM. *Triatoma lenti* sp. n. *Triatoma pessoai* sp. n. and *Triatoma bahiensis* sp. n. from the state of Bahia Brazil. Gazeta Medica da Bahia. 1967;67: 75–92.

Sherlock IA, Serafim EM. Fauna Triatominae no Estado da Bahia, Brasil: as espécies e distribuição geográfica. Rev Soc Bras Med Trop. 1972;6: 265–276.

Soares R, Barbosa SE, Borges EC, Júnior T. Genetic studies of *Psammolestes tertius* (Hemíptera: Reduviidae: Triatominae) using male genital morphology, morphometry, isoenzymes, and random amplified polymorphic DNA. Biochem Genet. 2001;39: 1–13.

Sousa OE, Galindo P. Natural infections of *Triatoma dispar* Lent 1950 with *Trypanosoma cruzi* in Panama. Am J Trop Med Hyg. 1972;21: 293–295.

Souza R de CM de, Soares AC, Alves CL, Lorosa ES, Pereira MH, Diotaiuti L. Feeding behavior of *Triatoma vitticeps* (Reduviidae: Triatominae) in the state of Minas Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2011;106: 16–22.

Steindel M, Toma HK, Carvalho Pinto CJ de, Grisard EC, Schlemper BR Jr. Colonization of artificial ecotopes by *Panstrongylus megistus* at Santa Catarina Island, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; 1994;36: 43–50.

Stevens L, Dorn PL, Hobson J, de la Rua NM, Lucero DE, Klotz JH, et al. Vector blood meals and Chagas disease transmission potential, United States. Emerg Infect Dis. 2012;18: 646–649.

Stevens L, Monroy MC, Rodas AG, Dorn PL. Hunting, swimming, and worshiping: human cultural practices illuminate the blood meal sources of cave dwelling Chagas vectors (*Triatoma dimidiata*) in Guatemala and Belize. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8: e3047.

Suarez-Davalos V, Dangles O, Villacis AG, Grijalva MJ. Microdistribution of sylvatic triatomine populations in central-coastal Ecuador. J Med Entomol. 2010;47: 80–88.

Tay J. La enfermedad de Chagas en la República Mexicana. Salud Pública de México. 1981;22: 409–450.

Teixeira AR, Monteiro PS, Rebelo JM, Argañaraz ER, Vieira D, Lauria-Pires L, et al. Emerging Chagas disease: trophic network and cycle of transmission of *Trypanosoma cruzi* from palm trees in the Amazon. Emerg Infect Dis. 2001;7: 100–112.

Tonn RJ, Carcavallo RU, Ortega R. Notes on the biology, ecology and geographical distribution of *Rhodnius robustus* (Hemiptera, Reduviidae). Boletin de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. 1976;16: 158–162.

Tonn RJ. Aspectos biológicos, ecológicos y distribución geográfica de *Triatoma maculata* (Erichson, 1848), (Hemiptera, Reduviidae), en Venezuela. Boletín de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. 1978;18: 16–24.

Turienzo P, Di Iorio O. Insects found in birds' nests from Argentina: *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860 (Aves: Furnariidae), their inquiline birds and mammals, new hosts for

*Psammolestes coreodes* Bergroth, 1911 and *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). Zootaxa. 2014; 151–184.

Usinger RL. The triatominae of North and Central America and the West Indies and their public health significance. Publ Hlth Butt. Washington, D.C.; 1944;288: 1–83.

Valença-Barbosa C, Fernandes FA, Santos HLC, Sarquis O, Harry M, Almeida CE, et al. Molecular identification of food sources in Triatomines in the Brazilian northeast: Roles of goats and rodents in Chagas disease epidemiology. Am J Trop Med Hyg. 2015;93: 994–997.

Vargas MV, Montero-Gei F. *Triatoma dispar* Lent, 1950 in Costa Rica (Hemiptera, Reduviidae). J Med Entomol. 1971;8: 454–455.

Verano OT, Galvão AB. *Triatoma costalimai* sp., n. Rev Bras Malariol Doencas Trop. 1958;10: 199–205.

Waleckx E, Suarez J, Richards B, Dorn PL. *Triatoma sanguisuga* blood meals and potential for Chagas disease, Louisiana, USA. Emerging Infectious Disease journal. 2014;20: 2141.

Wanderley D, Carvalho ME, Silva RA, Rodrigues VL, Barbosa L, Curado I. Programa de Controle da Doença de Chagas - PCDCh. Bol Acad Nac Med. 2006;3: 13–18.

Wilson GT, Garippa D, Shake R, Manis A. Search of wood rat (*Neotoma*) nests in Taylor and Jones Counties, Texas, for the presence of Reduviidae infected with *Trypanosoma cruzi*. Southwest Nat. 1981; Available: <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302612137>

Wood SF. Notes on the distribution and habits of Reduviid vectors of Chagas' Disease in the southwestern United States (Hemiptera, Reduviidae). Pan-Pac Entomol. San Francisco, Calif.; 1941;17: 85–94.

Wood SF. The occurrence of *Trypanosoma conorhini* Donovan in the Reduviid bug, *Triatoma rubrofasciata* (Degeer) from Oahu, T. H. Proc Hawaii Entomol Soc. 1946;12: 651 p.

Wood SF, Wood FD. Observations on vectors of Chagas' disease in the United States. III. New Mexico. Am J Trop Med Hyg. 1961;10: 155–165.

Zarate LG, Zarate RJ. A checklist of the Triatominae (Hemiptera, reduviidae) of Mexico. Int J Indust Entomol. 1985;27: 102–127.

Zárate LG, Zárate RJ, Tempelis CH, Goldsmith RS. The biology and behavior of *Triatoma barberi* (Hemiptera: Reduviidae) in Mexico. I. Blood meal sources and infection with *Trypanosoma cruzi*. J Med Entomol. 1980;17: 103–116.

Zavala-Velázquez J, Barrera-Pérez M, Rodríguez-Félix ME, Guzmán-Marín E, Ruíz-Piña H. Infection by *Trypanosoma cruzi* in mammals in Yucatan, Mexico: a serological and parasitological study. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1996;38: 289–292.

Zeledón R, Rabinovich JE. Chagas Disease: an ecological appraisal with special emphasis on its insect vectors. Annu Rev Entomol. 1981;26: 101–133.

Zeledón R, Solano G, Zúñiga A, Swartzwelder JC. Biology and ethology of *Triatoma dimidiata* (Latreille, 1811). 3. Habitat and blood sources. J Med Entomol. 1973;10: 363–370.

Zeledón R, Calvo N, Montenegro VM, Lorosa ES, Arévalo C. A survey on *Triatoma dimidiata* in an urban area of the province of Heredia, Costa Rica. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2005;100: 507–512.

Zeledón R, Cordero M, Marroquín R, Lorosa ES. Life cycle of *Triatoma ryckmani* (Hemiptera: Reduviidae) in the laboratory, feeding patterns in nature and experimental infection with *Trypanosoma cruzi*. Mem Inst Oswaldo Cruz. SciELO Brasil; 2010;105: 99–102.